

Nome**FRANCIELA DE MATTOS****Idade****43a 4m 28d****Data do Exame****27/08/2025****LAUDO**

Por meio da incidência radiográfica panorâmica, podemos observar:

ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE

- Septo nasal íntegro e sem desvio;
- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;
- Discreto espessamento da mucosa no assoalho do seio maxilar direito;

ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO

- Elemento(s) ausente(s): 18, 28, 36, 48;
- Elemento(s) mesio inclinado(s): 38, 37;
- Elemento(s) apinhado(s): 12-11-21;

ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL

- Perda óssea horizontal generalizada;
- Imagem do(s) elemento(s) 16 compatível com presença de material endodôntico, pino intracanal e coroa protética. Área de rarefação óssea difusa envolvendo o periápice compatível com cicatriz fibrosa, neoformação óssea ou processo inflamatório. Sugere-se incidência periapical para melhor avaliação. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Imagem do(s) elemento(s) 46 compatível com presença de material endodôntico e restauração coronária. Aumento do espaço pericementário. Sugere-se incidência periapical para melhor avaliação. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Aumento do espaço pericementário no(s) elemento(s): 26, 27;
- Imagem radiopaca, de limites definidos, na região correspondente ao elemento 48 sugestiva de osteoesclerose idiopática, alteração no padrão do trabeculado ósseo, sugere-se realização de radiografia periapical da região para melhor avaliação;
- Sugere-se incidência periapical dos incisivos superiores e inferiores para melhor avaliação;

ALTERAÇÕES EM COROA

- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 17, 16, 15, 14, 12, 24, 25, 26, 27, 38, 37, 35, 34, 44, 45, 46, 47;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáriosa recorrente ou material forrador na coroa do(s) elemento(s): 24(OD), 25(OM), 26(O), 27(O), 46(O), 47(O);
- Subcontorno, desadaptação marginal e/ou lesão cáriosa infiltrativa da coroa protética no(s) elemento(s): 16(D);
- Sugere-se realização de radiografias interproximais dos dentes posteriores para melhor visualização das faces proximais (adaptação das restaurações e/ou lesões cárias);
- Desgaste incisal sugestivo de atrição na coroa do(s) elemento(s): 32, 31, 41, 42;
- Calcificação pulpar no(s) elemento(s): 26;

Ausência de sinais radiográficos em nível de tomada panorâmica que indiquem alterações nas demais estruturas;

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévios e/ou subsequentes.

Assinado Digitalmente por
Dr. Rodrigo Vilela
CRM-SC 10.882
Radiologista