

Exame: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DA MAXILA E MANDÍBULA

INTERPRETAÇÃO


Metodologia do Exame: Foi realizado exame Tomográfico Computadorizado com Aquisição Volumétrica (Cone Beam). O espaçamento entre os cortes parassagitais é de 1mm.

Interpretação do exame: Os cortes parassagitais apresentam numerações no canto superior direito que equivalem aos números constantes na parte inferior da reconstrução panorâmica. Utilizando-se a escala milimétrica presente no lado direito dos cortes ortorradiais, obtém-se o valor real da região desejada.

O laudo do exame é baseado nas reconstruções multiplanares (cortes axiais, sagitais e coronais) e a imagem em 3D, quando presente, é de caráter ilustrativo.

Descrição do Exame:

- Ausência/agenesia dos dentes 35, 45 e 48.
- Retenção prolongada dos dentes 75 e 85. Nota-se mesioversão do dente 75.
- Alteração morfológica do dente 12 (dens in dente).
- Dente 36 apresenta raiz supranumerária lingual (*radix entomolaris*).
- Dentes 18 e 28 retidos, mesioinclinados, com rizogênese incompleta e impactados nos dentes 17/27 sem promover reabsorção. Ambos os dentes apresentam uma única raiz, cujo terço apical está em íntimo contato com o assoalho dos seios maxilares. A coroa de ambos os dentes promove rompimento na cortical óssea alveolar.
- Dente 38 retido, com inclinação para mesial e lingual e impactado no dente 37 sem promover reabsorção. A coroa do dente 38 rompe parcialmente a cortical óssea alveolar na face distal do 37. O dente apresenta 3 raízes fusionadas, cujo terço apical tangencia a cortical óssea do teto e parede lateral (vestibular) do canal mandibular.
- Presença de contenção ortodôntica nos dentes 33 ao 43.
- Imagem hipodensa sob a restauração do dente 16 sugestiva de material forrador sem carga, falta de adaptação ou lesão cariosa. Sugiro avaliar clinicamente.
- Imagem hipodensa na coroa do dente 47O sugestiva de cárie em dentina.
- Presença de material obturador nos condutos radiculares do 22 e 46. Terço apical do conduto DL do dente 46 parcialmente repletado. Regiões periapicais sem alterações.
- Imagem hiperdensa circular no assoalho do seio maxilar direito sugestiva de pseudocisto de retenção mucoso.
- As medidas realizadas são anatômicas e não representam necessariamente tamanho e inclinação para implantes dentários.
- Legenda: CM = Canal Mandibular.


Nestor da Costa Coimbra Júnior
Especialista em Radiologia Odontológica
CRO/RS 22911