

- A radiografia panorâmica é complemento do exame clínico;
- Côndilos bem posicionados;
- Seios maxilares com corticais preservadas e radiopacidade habitual;
- Fossas nasais com hipertrofia de cornetos. Sugere avaliação com otorrinolaringologista;
- Ramos e corpo mandibular sem alteração do trabeculado;
- Dentes 27 e 28 ausentes;
- Imagem compatível com dente 18 incluso;
- Dentes 17, 16, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 37, 36, 35, 34, 32, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 com imagem radiolúcida compatível com cárie ou material restaurador. Para correto diagnóstico de cárie, sugere avaliação clínica, radiografias bite wing e periapicais anterior;
- Dente 47 com tratamento endodôntico. Sugere radiografia periapical para precisa avaliação;
- Demais dentes presente sem alterações estruturais/morfológicas e elementos de sustentação periodontal visualizados com aspecto de normalidade dentro dos limites radiográficos;
- Com finalidade de avaliação de estruturas óssea e dentária de incisivos superior e inferior, faz-se necessário radiografias periapicais, justificada por limitação de precisa avaliação da região na presente técnica radiográfica.

Lívia Costa  
Lívia Costa  
CIRURGIÃ DENTISTA  
CRO-BA 8830