

Nome**THAISE CAMILE CORREIA****Idade****22a 5m 18d****Data do Exame****03/07/2025****LAUDO**

Por meio das incidências radiográficas panorâmica e periapicais para os incisivos superiores/inferiores, podemos observar:

ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE

- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal integro e sem desvio;
- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;

ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO

- Elemento 38 semi-incluso, retido e em posição vertical;
- Elemento 48 semi-incluso, impactado e mésio inclinado;
- Elemento(s) mésio inclinado(s): 36;
- Elemento(s) apinhado(s): 14/13, 12/11, 32/31;
- Observa-se relação de imagem dos ápices radiculares dos elementos 38 e 48 com o canal mandibular. Sugere-se, a critério clínico, exame de tomografia computadorizada de feixe cônico para melhor avaliação;

ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL

- Faixa radiopaca no conduto radicular do(s) elemento(s) 46 compatível com tratamento endodôntico aquém do ápice. Área de rarefação óssea difusa envolvendo o periápice compatível com cicatriz fibrosa, neoformação óssea ou processo inflamatório. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Imagem do(s) elemento(s) 36 compatível com presença de material endodôntico, pino intracanal e coroa protética. Aumento do espaço pericementário apical. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Aumento do espaço pericementário no(s) elemento(s): 14, 13, 12, 21, 22, 23, 24, 33, 31, 41, 47, 48;

ALTERAÇÕES EM COROA

- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 46;
- Área radiolúcida sugestiva de lesão cáriosa ou artefato na coroa do(s) elemento(s): 16(O ou face livre-discreta), 24(MD-discreta), 25(D-discreta), 27(O ou face livre-discreta), 37(O ou face livre-discreta), 47(O ou face livre-discreta). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáriosa recorrente ou material forrador, na coroa do(s) elemento(s): 36(MD) e 46(MD);
- Desgaste incisal sugestivo de atrição na coroa do(s) elemento(s): 11, 21, 32-42;

Ausência de sinais radiográficos em nível de tomadas panorâmica e periapicais que indiquem alterações nas demais estruturas;

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévio e/ou subsequentes.

Assinado Digitalmente por
Dr. Rodrigo Vitor
CRM-SC 10.882
Radiologista